

A DIETA DE *Dendrocincla fuliginosa* (Passeriformes: Dendrocolaptidae) EM MUCAJAÍ, RORAIMA

Renata de Melo Valente (Bolsista de Iniciação Científica), Samuel L. Borges (Aluno de Iniciação Científica, UFPa) e David Oren (Pesquisador do DZO/MPEG/CNPq)

Dendrocincla fuliginosa alimenta-se, em grande parte, de artrópodes afugentados por formigas-de-correição. Forrageia no nível médio da mata, mas na ausência de competidores, pode se deslocar para poleiros mais baixos, onde é maior a disponibilidade de alimento. A dieta dessa espécie já foi estudada anteriormente em duas localidades, uma na presença e outra na ausência de *Dendrocincla merula*, espécie competidora que ocupa o estrato baixo da mata. Este trabalho objetiva o estudo da dieta de *D. fuliginosa* em Mucajaí, onde *D. merula* está presente, e sua posterior comparação com os resultados obtidos nos trabalhos já realizados, verificando se ocorrem diferenças na dieta de *D. fuliginosa* de acordo com a ocorrência ou não daquela espécie. Para tanto, foi analisado o conteúdo estomacal de 11 indivíduos, cujo material foi preservado em etanol a 70% e examinado em microscópio estereoscópico. A proporção de cada categoria de presa foi determinada pela média das proporções encontradas em cada estômago. Para a comparação entre os trabalhos utilizou-se o teste "t" de Student. A dieta de *D. fuliginosa* em Mucajaí foi composta basicamente por Coleoptera (39,61%), Hymenoptera (19,74%), Formicidae (15,13%) e Arachnida (11,67%). A composição da dieta não diferiu entre os trabalhos ($P > 0.05$), o que indica que o deslocamento provocado pela ausência do competidor não interfere de forma significativa na dieta desta espécie.