

A FLÓRULA FANEROGÂMICA DAS RESTINGAS DO ESTADO DO PARÁ. I - ILHAS DE MAIANDEUA E ALGODOAL. FAMÍLIA POLYGALACEAE

Alvadir Tavares de Oliveira (Bolsista de Iniciação Científica)
e *João Ubiratan M. dos Santos* (Pesquisador DBO/MPEG/CNPq)

Maiandeuá e Algodóal são ilhas do litoral paraense situadas no município de Maracanã a cerca de 00°34'45" a 00°34'12" de lat. S e 47°31'05" a 47°34'12" de long. O. Nas restingas dessas ilhas a família Polygalaceae está representada pelo gênero *Polygala* L., com as espécies *P. spectabilis* DC., *P. variabilis* H.B.K., *P. apressa* Benth., *P. monticola* H.B.K. e *P. adenophora* DC. Para execução deste trabalho utilizou-se material coletado nos locais em estudo e exemplares do herbário do MPEG. As observações morfológicas foram realizadas no estereomicroscópio ZEISS acoplado a câmara clara. A nomenclatura adotada para indicar a forma e o indumento das estruturas morfológicas, foi baseada nos trabalhos de LAWRENCE (1973), RADFORD et al (1974) e RIZINNI (1977). *P. spectabilis* é um arbusto com caule cilíndrico, lenhoso, com indumento seríceo, folhas elípticas, com indumento seríceo na face ventral e dorsal, inflorescência racemosa. *P. variabilis* é uma erva de caule cilíndrico, herbáceo, glabro, estriado, folhas agudas, espaçadas, pequenas, lineares, carnosas, glabras em ambas as faces, inflorescência em glomérulos. *P. apressa* é uma erva de caule cilíndrico, herbáceo, glabro, estriado, folhas agudas, aproximadas, pequenas, lineares, carnosas, glabras, inflorescência espiciforme. *P. monticola* H.B.K., erva de caule cilíndrico, herbáceo, com indumento serício, folhas aproximadas, oblongas, alternas; Inflorescência racemosa. *P. adenophora* DC., erva de caule cilíndrico, herbáceo, glabro, folhas espaçadas, agudas, lineares, carnosas; Inflorescência em glomérulo (CNPq/MPEG).