

# A flórula fanerogâmica das restingas do estado do Pará. Família Apocynaceae Jussieu

Ivete da Silva Pereira

Orientador: Dr. João Ubiratan M. dos Santos  
Vigência da bolsa: agosto/01 a julho/02

A flórula fanerogâmica das restingas do estado do Pará está constituída por 6 formações vegetais e cerca de 300 espécies, dentre as famílias presentes destaca-se a Apocynaceae Jussieu. Este trabalho tem por objetivo realizar estudos taxonômicos das espécies representativas desta família, fazendo parte de um projeto maior que visa identificar, descrever e ilustrar as espécies ocorrentes nestas restingas, localizada no nordeste do Estado. Para esta pesquisa foi feito um levantamento das espécies da família Apocynaceae, sendo os espécimes coletados, identificados por comparação com outros depositados nos herbários MG e IAN e através da literatura existente, onde constatou-se a presença de 4 gêneros e 5 espécies, apresentadas a seguir: *Himatanthus articulatus* (Vahl.) Woodson: árvore de até 4 m de altura, folhas alternas, espiraladas, subsésseis; limbo de 10,5 a 15,6 cm de comprimento e de 6,2 a 7,6 cm de largura, ápice obtuso arredondado e base atenuada. Inflorescência subterminal, dicásio. Fruto com dois folículos. Encontrado na formação campo entre moitas. *Mandevilla birsuta* (Rich.) K. Schum.: cipó escandente, folhas opostas, membranáceas; limbo de 4,1 a 6,8 cm comprimento e de 1,2 a 3,2 cm de largura, elíptico, ápice acuminado e base truncada. Inflorescência racemosa, axilar a lateral. Localiza-se na formação arbustiva aberta. *Mandevilla scabra* (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) K. Schum.: cipó sobre árvore, folhas opostas, pecioladas, cartáceas; limbo de 4,6 a 5,9 cm de comprimento e de 1,1 a 1,3 cm de largura, oblongo-elíptico, ápice acuminado e base cordada. Inflorescência racemosa lateral. Encontra-se em campo arbustivo aberto. *Rhabdadenia biflora* (Jacq.) Müll. Arg.: cipó trepador, folhas decussadas, membranáceas, pecioladas, coriáceas; limbo de 7,2 a 11,2 cm de comprimento e de 2,4 a 4,1 cm de largura, oval, ápice mucronado e base cuneada. Inflorescência lateral a subterminal, pleiocásio. Localiza-se na formação brejo herbáceo. *Tabernaemontana angulata* Mart. ex Müll. Arg: arbusto de 1,5 cm de altura, folhas opostas, glabras, pecioladas; limbo de 13,4 a 19,8 cm de comprimento e de 4,2 a 6,5 cm de largura, oblongo-lanceolado a elíptico, ápice acuminado e base cuneada. Inflorescência em cimeira, terminal. Encontra-se em subbosque da formação mata de restinga.