

# BRIOFLORA DA ILHA DE MARAJÓ – CHAVES

*Anna Cristina Malcher Muniz*

No município de Chaves, ilha de Marajó (PA), foram coletadas amostras de briófitas (musgos e hepáticas), com o objetivo de determinar a diversidade da brioflora, em continuação ao projeto que visa a estudar este grupo em todos os municípios da ilha de Marajó. O material coletado está sendo identificado, a nível específico, com auxílio de chaves taxonômicas e/ou comparação com material de referência. Até o momento, foram identificadas 09 famílias de musgos: Sematophyllaceae, Thuidiaceae, Pottiaceae, Fissidentaceae, Bryaceae, Leucobryaceae, Calymperaceae, Hookeriaceae, Hypnaceae. Dentro das famílias, as espécies que mais se destacaram pelo número de ocorrências foram: *Taxithelium planum* (Brid.), Mitt., *Sematophyllum subsimplex* (Hedw.) Mitt., *Hyophila involuta* (Hook.) Jaeg., *Octoblepharum albidum* Hedw. Var *albidum*, *Calymperes palisotti* subsp. *richardii* (C. Muell.) S. Edwards e *Bryum apiculatum* Schwaegr., apresentadas neste trabalho com comentários taxonômicos e fotomicrografias.

---

Orientadora: Profa. Regina Célia Lobato Lisboa, Departamento de Botânica.

Bolsa PIBIC: 08.96 a 07.97