

FLÓRULA FANERÓGAMA DAS RESTINGAS DO ESTADO DO PARÁ. ILHAS DE ALGODOAL E MAIANDEUA. FAMÍLIA OCHNACEAE DC.

Joyce Kellen Ferreira Buna

As ilhas de Algodoal e Maiandeuá situam-se no litoral nordeste do Estado do Pará, no município de Maracanã, onde destaca-se o ecossistema restinga, com seus diferentes tipos vegetacionais, sendo encontrada em sua diversidade florística, algumas espécies da família Ochnaceae DC, objeto deste estudo. O trabalho tem como objetivo realizar o levantamento da família Ochnaceae DC. e sua distribuição na restinga mencionada, e efetuar o tratamento taxonômico de suas espécies, elaborando chave taxonômica para facilitar a identificação das mesmas e suas descrições taxonômicas. A metodologia usada neste trabalho é aquela comumente empregada em taxonomia vegetal. A família Ochnaceae DC. tem maior número de gêneros e espécies na América do Sul Tropical. No Brasil, está representada por cerca de 9 gêneros com 105 espécies. No local de estudo, a família consta de 2 gêneros: *Ouratea* Aubl. e *Sauvagesia* L., e 4 espécies - *O. castanaefolia* (D.C.) Engl. Arbusto com cerca de 2m de altura, folhas simples, alternas, glabras, penínérveas, com ápice acuminado e base cuneada, margem serrilhada; limbo de 4,0 - 8,0cm de comprimento e 2,5 - 4,0cm de largura; flor amarela; fruto drupáceo. Localizada em moitas no campo arbustivo aberto. *O. microdonta* (Dalz.) Engl. Arbusto de até 3m de altura, folhas simples, alternas, glabras, pecioladas, penínérvea, ápice e base obtusos; limbo de 4,0 - 6,5cm de comprimento e 2,0-3,5cm de largura; flor branca e fruto drupáceo. *O. racemiformes* Ul. Arbusto com cerca de 2m de altura, folhas alternas, simples, glabras, pecioladas, com ápice acuminado e base obtusa, limbo de 3,0-7,0cm de comprimento e 2,0-3,5cm de largura; flor amarela; fruto drupáceo. Estas duas últimas espécies descritas, têm como habitat as moitas de formação arbustiva aberta e mata de restinga da praia da Princesa. *Sauvagesia erecta* L. Planta herbácea, ereta, com cerca de 25cm de altura, folhas alternas, simples, lanceoladas, ápice e base agudos, margem serrilhada; limbo de 0,4-1cm de comprimento e 0,2-0,4cm de largura; flores róseas; fruto capsular. Localiza-se no campo arbustivo aberto, entre moitas.

Orientador: *João Ubiratan M. dos Santos* - Departamento de Botânica/MPEG
Vigência da bolsa: fevereiro/2000 a julho/2000