

# A flórua fanerogâmica das restingas do Estado do Pará. Família Moraceae Lindl

Ivete da Silva Pereira

Orientador: Dr. João Ubiratan Moreira dos Santos

Vigência da bolsa: agosto/02 a julho/03

34

A flórua fanerogâmica das Restingas do Pará está constituída por 6 formações vegetais e cerca de 300 espécies, dentre as famílias presentes destaca-se a Moraceae Lindl., objeto deste estudo. Para esta pesquisa foi feito um levantamento das espécies dessa família ocorrentes em toda a costa paraense, sendo os espécimes coletados, identificados por comparação com outros depositados nos herbários MG e IAN e através da literatura existente, onde constatou-se a presença de 2 gêneros e 4 espécies, apresentadas a seguir: *Brosimum guianense* (Aubl.) Huber.: árvore de 10 a 25 m de altura, folhas alternas, elípticas, cartáceas a subcoriáceas; limbo de 1,5 a 8,2 cm de comprimento e de 1,0 a 3,2 cm de largura, pecíolo de 0,1 a 0,5 cm de comprimento, ápice acuminado, base aguda a obtusa, margem inteira. Inflorescência usualmente bissexual, discóide ou largamente turbinada ou hemisférica. Encontra-se na Mata de Restinga. *Ficus catappifolia* Kunth & Bouché.: árvore de 23,7 a 25,7 cm de altura, folhas simples, alternas, subobovadas a oblongas, coriáceas; limbo de 11,7 a 18 cm de comprimento e de 5,5 a 8 cm de largura, pecíolo de 0,5 a 1,5 cm de comprimento, ápice obtuso a arredondado, base obtusa. Inflorescência cimosa do tipo sicônio nas axilas das folhas. Encontra-se nas Moitas da Formação Arbustiva Aberta e sobre Dunas. *Ficus obtusifolia* H. B. K.: árvore de 20 a 30 cm de altura, de copa ampla, folhas simples, alternas, subobovadas a obovadas, coriáceas; limbo de 9,8 a 24,7 cm de comprimento e de 5,7 a 11 cm de largura, pecíolo de 1,0 a 3,7 cm de comprimento, ápice obtuso, base obtusa. Inflorescência cimosa do tipo sicônio nas axilas das folhas. Localiza-se nas Moitas da Formação Arbustiva Aberta. *Ficus guianensis* Desv. ex Ham.: árvore de 26 cm de altura, folhas alternas, oblongo-lanceoladas a elípticas, coriáceas; limbo de 9,3 a 13,4 cm de comprimento e de 4,3 a 5,9 cm de largura, pecíolo de 0,9 a 1,4 cm de comprimento, ápice agudo a obtuso, base aguda a obtusa. Inflorescência cimosa do tipo sicônio nas axilas das folhas. Encontra-se nas Moitas da Formação Arbustiva Aberta e Mata de Restinga.