

## INSECTA – DIPTERA – PIOPHILIDAE (INCL. THYREOPHORIDAE)

Nelson Papavero<sup>1</sup> & Therezinha J. Pimentel

Coordenação de Zoologia, Museu Paraense Emílio Goeldi, C. P. 399,  
66.040-970 Belém, PA

<sup>1</sup>Pesquisador Visitante (Bolsista do CNPq)

**Abstract:** Brazilian Amazonia has five registered [but probably 7] (out of 10 neotropical) species of Piophilidae.

**Key Words:** Diptera, Piophilidae, Brazilian Amazonia, faunal composition.

Os Piophilidae mundiais foram revistos em um magnífico trabalho de McAlpine (1977), onde se encontram: um estudo detalhado da morfologia externa; sua reclassificação, com chaves para identificação até espécie; filogenia; biogeografia; dados biológicos. Esta família é predominantemente holártica, com poucas espécies endêmicas na região neotropical.

Os representantes neotropicais de Piophilidae pertencem todos à subfamília Piophilinae, tribo Piophilini, e distribuem-se nas subtribos Piophilina (4 gêneros e 8 espécies) e Thyreophorina (com 1 gênero e 2 espécies). Destes, 4 gêneros e 5 espécies foram registrados efetivamente para a Amazônia brasileira (Tabela 1), e mais duas espécies, pelo menos, podem vir a ser encontradas nessa região. Vivem sobre cadáveres e são coletados sobre estes em sua fase final de decomposição. As larvas das espécies exclusivamente neotropicais são ainda desconhecidas.

**Tabela 1: Número de espécies de Piophilidae na Região Neotropical e na Amazônia Legal Brasileira**

Gênero	Espécies na Região Neotropical	Espécies na Amazônia Legal Brasileira
<i>Piophila</i>	1	1
<i>Prochyliza</i>	3	-
<i>Protopiophila</i>	3	2
<i>Stearibia</i>	1	1
<i>Bocainamyia</i>	2	1
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>5</b>

**Chave para subtribos e gêneros de Piophilidae (subfamília Piophilinae, tribo Piophilini) da Região Neotropical (adaptado de McAlpine, 1977)**

1. Escutelo grandemente alongado e achatado (Subtribo Thyreophorina) ..... *Bocainamyia*

- Escutelo normal (Subtribo Piophilina) ..... 2
- 2. Pós-pronoto (úmero) com 2 cerdas, a mais interna curvada para dentro; mesonoto com 1 + 3 dorsocentrais ..... *Protopiophila*
  - Pós-pronoto com 1 só cerda, ou sem cerdas; mesonoto com 0 + 1 dorsocentrais ..... 3
- 3. Anepesterno (pteropleura) setuloso ..... 4
  - Anepesterno nu ..... *Stearibia*
- 4. Mesonoto uniformemente setuloso; fileiras de sétulas supralares, dorsocentrais e acrosticais não isoladas ..... *Prochyliza*
  - Mesonoto quase todo nu; sétulas grandemente confinadas a três fileiras isoladas nos campos dorsocentral e acrostical ..... *Piophila*

### Catálogo dos Piophilidae da Amazônia brasileira

Subfamília PIOPHILINAE

Tribo PIOPHILINI

Subtribo PIOPHILINA

Gênero *Piophila* Fallén

***Piophila* Fallén, 1810: 20.** Espécie-tipo, *Musca casei* Linnaeus (mon.).

***Tyrophaga* Kirby in Kirby & Spence, 1826: 78.** Espécie-tipo, *Musca casei* Linnaeus (mon.).

***casei*** (Linnaeus), 1758: 597 (*Musca*). Localidade-tipo: “Europa”. Distr. - Cosmopolita. [Cuba, Jamaica, Ilhas Juan Fernández, México, Costa Rica, Venezuela, Equador, Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina, Chile]. Refs. - Guimarães, 1931: 16; Hennig, 1943.

***meridionalis*** Hendel, 1933: 219. Localidade-tipo: Paraguai, Santa Trinidad.

Gênero **Protopiophila** Duda

**Protopiophila** Duda, 1924: 109. Espécie-tipo, *Piophila latipes* Meigen (Harrison, 1959).  
**Clusina** Curran, 1934: 449. Espécie-tipo, *nigriventris* Curran (des. orig.).

**Chave para as espécies neotropicais  
(adaptada de McAlpine, 1977: 38)**

1. Mesonoto quase todo destituído de sétulas finas, estas confinadas a fileiras simples nos campos supralar, dorsocentral e acrostical (Peru, Brasil: PA) ..... *atrichosa* McAlpine  
- Mesonoto uniforme e densamente setuloso, com pelo menos 6 fileiras no campo acrostical ..... 2
  2. Palpos grandes e achatados (Guiana, Brasil: PA) ..... *nigriventris* (Curran)  
- Palpos pequenos e mais ou menos cilíndricos (Peru, Guiana) ..... *pallida* McAlpine
- atrichosa** McAlpine, 1977: 38. Localidade-tipo: Peru, Avispas, Madre de Dios. Distr. - Belize, Peru, Brasil (PA: Faz. Taperinha e Maloquinha [exemplares no Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo]).
- nigriventris** (Curran), 1934: 449 (*Clusina*). Localidade-tipo: Guiana, Bartica, Kartabo. Distr. - Guiana, Brasil (PA: Fazenda Taperinha, Maloquinha, e Barreirinhas, rio Tapajós [exemplares no Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo]).
- pallida** McAlpine, 1977: 40. Localidade-tipo: Peru, Avispas, Madre de Dios. Distr. - Peru, Guiana. **Ainda não assinalada na Amazônia brasileira, mas muito provavelmente ocorrendo na área.**

Gênero **Stearibia** Lioy

**Stearibia** Lioy, 1864: 1005. Espécie-tipo, *Piophila foveolata* Meigen (mon.) = *nigriceps* (Meigen).

**nigriceps** (Meigen), 1826: 397 (*Piophila*). Localidade-tipo: “Europa”. Distr. - Holártica; Brasil (PA: Fazenda Taperinha, e Barreirinhas, rio Tapajós [exemplares no Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo]), Peru, Chile. Refs. - Hennig, (1943, larva), Zuska & Lastovka (1965).

Subtribo THYREOPHORINA

Gênero **Bocainamyia** Albuquerque

**Bocainamyia** Albuquerque, 1953: 109. Espécie-tipo, *necrophila* Albuquerque (des. orig.).

**Chave para as espécies  
(seg. McAlpine, 1977: 54)**

1. Asas esfumaçadas sobre ambas as veias transversais anterior e posterior e ao redor da célula 1M2; escutelo amarelo ..... *hagmannarum*  
- Asas inteiramente hialinas; escutelo preto ..... *necrophila*
- hagmannarum** Papavero, 1971: 106, figs. 1-11. Localidade-tipo: Brasil, PA, Fazenda Taperinha. Distr. - Brasil (PA), Guiana (Moraballi Creek, rio Essequibo).
- necrophila** Albuquerque, 1953: 110, figs. 1-5. Localidade-tipo: Brasil, SP, Serra da Bocaina, Fazenda Lajeado. Distr. - Brasil (RJ, SP), Peru (Avispas, Madre de Dios). Ref. - Albuquerque, 1957 (descr. da fêmea). **Esta espécie deve provavelmente ocorrer na Amazônia Legal Brasileira, mas ainda não foi efetivamente assinalada.**

**Índice**

(Sinônimos em *italíco*)

- atrichosa* McAlpine, 1977, *Protopiophila* - 15.2  
*Bocainamyia* Albuquerque, 1953 - 15.3  
*casei* (Linnaeus), 1758 (*Musca*), *Piophila* - 15.1  
*Clusina* Curran, 1934 - 15.2  
*hagmannarum* Papavero, 1971, *Bocainamyia* - 15.2  
*meridionalis* Hendel, 1933, *Piophila* - 15.1  
*necrophila* Albuquerque, 1953, *Bocainamyia* - 15.2  
*nigriceps* (Meigen), 1826 (*Piophila*), *Stearibia* - 15.2  
*nigriventris* (Curran), 1934 (*Clusina*), *Protopiophila* - 15.2  
*pallida* McAlpine, 1977, *Protopiophila* - 15.2  
*Piophila* Fallén, 1910 - 15.1  
*Piophilina* - 15.1  
*Piophilinae* - 15.1  
*Piophilini* - 15.1  
*Protopiophila* Duda, 1924 - 15.2  
*Stearibia* Lioy, 1864 - 15.2  
*Thyreophorina* - 15.2  
*Tyrophaga* Kirby, 1826 - 15.1

**Referências**

- Albuquerque, D. de O.,** 1953. Sobre um gênero e uma espécie nova de ‘Thyreophoridae’ do Brasil (Diptera, Haplostomata). *Revta bras. Biol.* 13(2): 109-112, 5 figs.

- Albuquerque, D. de O.**, 1957. Descrição do alótípo fêmea de '*Bocainamyia necrophila*' Albuquerque, 1953 e considerações sobre o gênero (Diptera, Thyreophoridae). *Revta bras. Biol.* 17: 563-566, 5 figs.
- Curran, C. H.**, 1934. The Diptera of Kartabo, Bartica District, British Guiana. *Bull. Am. Mus. nat. Hist.* 66 (3): 287-532, 53 figs.
- Duda, O.**, 1924. Revision des europäischen u. grönlandischen sowie einiger südostasiat. Arten der Gattung *Piophila* Fallén (Diptera). *Konowia* 3: 97-203.
- Fallén, C. F.**, 1810. *Specim. entomolog. novam Diptera disponendi methodum exhibens*, 26 pp., 1 pl. Lund.
- Guimarães, J. R. A.**, 1931. Estudos sobre uma 'Piophilidae' de Ubatuba. *Bolm biol.*, Rio de Janeiro 17: 16-17, 1 pl.
- Harrison, R. A.**, 1959. Acalyptrate Diptera of New Zealand. *Bull. N. Z. Dept. scient. ind. Res.* 128: viii + 382 pp., 438 figs.
- Hendel, F.**, 1933. Von Dr. Zürcher in den Jahren 1913-1918 in Paraguay gesammelte acalyprate Dipteren. *Revta Ent.*, Rio de Janeiro 3: 213-224.
- Hennig, W.**, 1943. Piophilidae, in Lindner, E., ed., *Fliegen palaearkt. Region 6* (Teil 60a): 91 pp., 100 figs.
- Kirby, W. & W. Spence**, 1826. *An introduction to entomology, or elements of the natural history of insects* [1ed.], Vol. 4: 634 pp., pls. 21-30. London.
- Linnaeus, C.**, 1758. *Systema naturae per regna tria naturae*. 10ed. Vol. 1: 822 pp. Holmiae [=Stockholm].
- Lioy, P.**, 1864. I ditteri distribuiti secondo un nuovo metodo di classificazione naturale. *Atti imp. r. Ist. veneto Sci. Let. Arti* (3) 9: 499-518, 569-604, 719-771, 878-910, 989-1027, 1087-1126, 1311-1352.
- McAlpine, J. F.**, 1977. A revised classification of the Piophilidae, including 'Neottiophilidae' and 'Thyreophoridae' (Diptera: Schizophora). *Mem. ent. Soc. Canadæ* 103: 1-66, 58 figs.
- Meigen, J. W.**, 1826. *Systematische Beschreibung der bekannten europäischen zweiflügeligen Insekten*, Vol. 6: xii + 412 pp., pls. 42-54. Hamm.
- Papavero, N.**, 1971. Um novo Thyreophoridae da Amazônia brasileira. *Papéis avulsos Zool.*, São Paulo 25(13): 105-109, 11 figs.
- Zuska, J. & P. Lastovka**, 1965. A review of the Czechoslovak species of the family Piophilidae with special reference to their importance to food industry (Diptera, Acalyptrata). *Acta ent. Bohemoslov.* 62(2): 141-157, 11 figs.