

A FLÓRULA FANEROGÂMICA DAS RESTINGAS DO ESTADO DO PARÁ. I - ILHAS DE MAIANDEUA E ALGODOAL. FAMÍLIA GUTTIFERAE

Alvadir Tavares de Oliveira

Maiandeuá e Algodóal são ilhas do litoral paraense situadas no município de Maracanã a cerca de 00°35'03" a 00°38'29" de lat. S e 47°31'54" a 47°34'57" de long. O. Nas restingas dessas ilhas a família Guttiferae está representada pelos gêneros *Rheedia* L., *Clusia* L. e *Vismia* Vand., com as espécies *R. acuminata* (Ruiz et Pavon) Planchon et Triana, *C. grandiflora* Splitg e *V. guianensis* (Aubl) Cloisy. Para a execução deste trabalho utilizou-se material coletado nos locais de estudo, comparados com exemplares do herbário do MPEG. As observações morfológicas foram realizadas em estereomicroscópio ZEISS com a câmara clara acoplada. A nomenclatura adotada, para indicar a forma e o indumento das estruturas morfológicas, foi baseada nos trabalhos de LAWRENCE (1973), RADFORD et al (1974) e RIZINNI (1977). *R. acuminata* é uma árvore com caule lenhoso, cilíndrico, glabro, folhas elípticas, opostas, de ápice agudo, base arredondada e margem lisa. Flores masculinas: Inflorescência inserida em um pulvínulo, cálice com sépalas orbiculares, corola com pétalas oblongas. Flores hermafroditas: Inflorescência em fascículo. *C. grandiflora* é um arbusto com caule lenhoso, cilíndrico, com indumento puberulento, folhas elíptico-lanceoladas, opostas, de ápice acuminado, base arredondada e margem lisa. Inflorescência terminal, cálice com sépalas suborbiculares, corola com pétalas obovadas. *V. guianensis* é um arbusto com caule lenhoso, cilíndrico, com indumento puberulento, folhas elíptico-lanceoladas, opostas, de ápice acuminado, base arredondada e margem lisa. Inflorescência terminal, paniculiforme, cálice com sépalas ovado-agudas, corola com pétalas obovadas.

Orientador: Prof. João Ubiratan M. dos Santos (DBO).

Bolsa PIBIC - 01.08.95 a 31.07.96.