

Melanconiaceae.

Glocosporium affine Sacc. Mich. I. p. 129.

Pará, sobre as folhas de *Oncidium altissimum*, vindo do Rio Tocantins, Junho 1899. N.^o 14.

As aglomerações de conídios são muito pouco desenvolvidas.

Pestalozzia Palmarum Cooke. Grev. t. 86. f. 3.

Pará, jardim botânico, sobre as folhas de *Livistonia Chinensis*. Junho 1899. N.^o 12.

V

MATERIAES PARA A FLORA AMAZONICA

IV. QUATRO NOVAS ESPECIES AMAZONICAS DO GENERO
GUAREA (MELIACEÆ)

Por C. DE CANDOLLE (Genebra)

Guarea L. Sectio Euguarea C. DC.

1. *G. costulata* sp. nov., Foliis 4-5-jugis, foliolis oppositis brevissime petiolulatis basi acutis apice breviter et obtuse acuminatis, ad nervum centralem utrinque parce pilosulis caeterum glabris, superioribus oblongo-ellipticis inferioribus minoribus ellipticis rhachi petiolulisque et petiolo parce pilosulis, paniculis simplicibus quam folia multo brevioribus adultis brevissime pedunculatis spicatum cymuligeris, cymulis 1-floris, capsulis e basi stipitiformi breviter subtetragono-oblongis glabris longitudinaliter et praesertim in stipite costulatis 4-loclaribus.

Aramá, beira do rio (n.^o 1883) J. Huber legit. *Jatuauba preta* incolarum.

Ramuli glabri in sicco pallido-rubescentes. Folia cum petiolis ad 20^{cm} longa, Foliola in

sicco firmo-membranacea minute et inconspicue pellucido-punctulata, superiora ad 16^{cm} longa et ad 5 $\frac{3}{4}$ ^{cm} lata nervis secundariis patule adscendentibus subrectis utrinque 10-12, inferiora 10^{cm} longa et 5^{cm} lata. Petioluli vix 3^{mm} longi. Petiolus 4 $\frac{1}{2}$ ^{cm} longus. Panicula hornotina, post anthesin 18^{cm} et fructifera 8^{cm} longa. Capsula cum stipite suo 3^{cm} longa medio 2^{cm} lata.

2. *G. subsessiliflora*, sp. nov., foliis sat longe petiolatis 4-5-jugis, foliolis oppositis breviter petiolulatis e basi cuneata oblongis apice obtusiuscule cuspidatis utrinque glabris rhachi petioloque teretibus glabris, paniculis florentibus subsessilibus glabris petiolos aequantibus vel paullo superantibus spicatim cymuligeris cymulis 1-floris floribus brevissime pedicellatis, calice extus puberulo 4-dentato dentibus rotundatis apice brevissime apiculatis hirtellisque, petalis oblongis apice acutis extus puberulis tubo ovato cylindrico margine brevissima crenulato antheris linearis-oblongis, ovario gynophorum glabrum superante breviter et adpresso pubescente, stilo glabro ovarium superante, loculis 2-ovulatis.

Pará, Una (n.º 1.244) M. Guedes legit.

Ramuli glabri in sicco pallide rubescentes. Folia cum petiolis circiter 36^{cm} longa. Foliola in sicco membranacea pellucido-punctulata, superiora 18 $\frac{1}{2}$ ^{cm} longa et ad 6^{cm} lata nervis secundariis subrectis tenuibus utrinque 10-12, inferiora gradatim minora infima magis elliptica fere 7^{cm} longa et 3 $\frac{1}{2}$ ^{cm} lata. Petioluli ad 7^{mm} longi. Petiolus 11^{cm} longus. Panicula hornotina, fere et basi cymuligera. Alabastra oblonga. Florum pedicelli fere 1^{mm} longi. Petala 4 in aestivatione valvata, in sicco rubescentia et subcoriacea, 8^{mm} longa 2^{mm} lata. Tubus 6^{mm} longus glaber. Antheræ 8 linearis-oblonga glabrae paullo infra medium dorso affixa 1^{mm} longæ. Stigma orbiculare carnosum, adultum e tubo brevissime exsertum. Ovula in loculis superposita.

b. *polyphyllaria*, forma foliis ad 8-jugis, pa-

nicula fructifera quam folium fere triplo breviorre, capsulis junioribus oblongo-obovatis adpresso pilosis.—*Jatuauba* incolarum.

Pará, sitio do Dr. Lobão Junior, no Marco da Legoa; (n.^o 91) J. Huber legit.

3. *G. odorata* sp. nov., foliis modice petiolatis 4-jugis glabris foliolis oppositis longiuscule petiolulatis basi acutis apice breviter obtususcule cuspidatis superioribus majoribus subobovato oblongis infimis multo minoribus ellipticis, paniculis brevissime pedunculatis simplicibus pendulis folia fere æquantibus spicatum cymuligeris glabris cymulis 3-floris, floribus breviter pedicellatis, calice glabro 4-dentato dentibus rotundatis, petalis 4 extus adpresso minute puberulis anguste oblongis apice breviter obtususcule acuminatis, tubo glabro cylindrico apice subcampanulato margine integro, antheris ellipticis e tubo paulo exsertis, gynophoro apice toruloso, ovario gynophorum æquante adpresso hirsuto, stilo fere glabro quam ovarium paulo longiore.

Cerro de Canchahuaya (Rio Ucayali), na beira d'um riacho (n.^o 1.463) J. Huber legit.

Arbuscula floribus albis fragrantibus. Ramuli glabri elenticellosi in sicco atro-rubescentes. Folia cum petiolis circiter 22 cm longa. Foliola in sicco firma opaca pellucido-punctata, superiora ad 23 cm longa et ad 7 cm lata, media ad 16 cm longa et ad 6 cm lata et magis elliptica, infima circiter 9 cm longa et 4 cm lata. Petioluli fere ad 1 cm, petiolus 6 cm, pedunculus 1 cm longi, florum pedicelli $\frac{1}{2}$ mm longi. Alabastra oblonga. Petala in aestivatione valvata fere 8 mm longa vix $1\frac{1}{2}$ mm lata in sicco rubescens. Tubus 7 mm longus. Antheræ 8 glabrae dorso infra medium affixaæ 1 mm-longæ. Ovarium 4-loculare. Stilus teres. Stigma orbiculare carnosum. Species *G. Mikanianae* C. DC. affinis.

4. *G. Guedesii* sp. nov., foliis 5-6-jugis, foliolis oppositis petiolulatis supra glabris subtus ad nervum centralem petiolulosque adpresso pilosulis et dein

utrinque glabris basi acutis apice acute vel obtusiuscule cuspidatis, superioribus subobovato-oblongis inferioribus minoribus oblongo-elliptiis, rhachi parce adpresse pilosula dein glabra, paniculis simplicibus folia subæquantibus spicatum cymuligeris cymulis 1-raro-2-floris, floribus brevissime pedicellatis calice extus parce puberulo 4-dentato dentibus ovato-rotundis apice apiculatis, petalis oblongis apice breviter acuminatis extus adpressa puberulis, tubo cylindrico glabro margina leviter crenulata, antheris ellipticis, ovario gynophorum glabrum superante adpresse hirsuto, stilo glabro.

Pará, Una (n.^o 1.240 a Manoel Guedes lecta).

Ramuli glabri in sicco pallide fuscantes. Foliac um petiolis circiter 26^{cm} longis. Foliola in sicco membranacea minuta pellucido-punctulata, superiora ad 18^{cm} longa et ad 5^{cm} lata, nervis secundariis patule adscendentibus subrectis utrinque 10 infima 10 $\frac{1}{2}$ ^{cm} longa 4 $\frac{1}{2}$ ^{cm} lata. Petioluli 5^{mm}, petioli 7-11^{cm}, pedunculi ad 6^{mm} longi. Bracteæ ovato-acuta extus adpresse puberulæ $\frac{3}{4}$ ^{mm}-longæ. Pedicelli 1^{mm} longi. Petala 4 ad 8^{mm} longa 2^{mm} lata. Tubus 6^{mm} longus. Antheræ 8 glabrae cum tubi denticulis obtusis alternae paullo supra basin dorso affixæ. Ovarium conoideum 4-loculare, loculis 2-ovulatis, ovulis superpositis. Stilus ovarium æquans. Stigma orbiculare carnosum.