

FLORA ORQUÍDICA DA MARGINAL DO RIO MARAPANIM, MUNICÍPIO DE MARAPANIM-PA

Alvadir T. de Oliveira

Apesar de ter ampla distribuição geográfica, é nas regiões tropicais que as orquídeas apresentam maior ocorrência de espécies epífitas e terrestre. O Brasil por sua grande superfície e localização predominantemente tropical, é um dos países mais ricos em Orchidaceae, sendo que a região Amazônica com seu expressivo número de habitats, pode ser considerada como uma das regiões mais ricas em diversidade e densidade de Orchidaceae. A área escolhida para este estudo é uma floresta de igapó, localizada às margens do rio Marapanim, na comunidade de Abaetezinho, município de Marapanim, sendo que via terrestre fica mais próximo do município de Igarapé-Açu a cerca de 13 km. Para execução deste trabalho realizou-se o levantamento de dados de campo através de amostragem de parcelas perpendiculares ao leito do rio, num total de 6 parcelas medindo cada uma 10,00 m x 20,00 m. Os materiais coletados no local de estudo foram levados para identificação e comparados com exemplares do herbário MG. Como resultados foram registradas 30 espécies distribuídas em 20 gêneros, onde as espécies *Dichaea picta* Rchb.f., *Epidendrum nocturnum* Jacq., *Maxillaria camaridii* Rchb.f., *Sobralia sessilis* Lindl., *Scaphyglottis sickii* bPabst., *Stellis paraensis* Barb. Rodr. e *Zigosepalum labiosum* (L. C. Rich.) Garay são as mais abundantes, encontrando-se por toda a extensão da floresta ao longo do rio (CNPq).

Orientadora: Manoela Ferreira F. Da Silva, Departamento de Botânica.

Vigência da bolsa: agosto de 1997 a Julho de 1998.